



ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แบบนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2564

วัคซีนจำเป็นที่ต้องให้กับเด็กทุกคน

วัคซีน	อายุ	แรกเกิด	1 เดือน	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน	9-12 เดือน	18 เดือน	2 ปี	4-6 ปี	11-12 ปี
บีซีจี ¹ (BCG)		BCG									
ตับอักเสบบี ² (HB)		HB1	(HB2)								
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทึ่งเซลล์ ³ (DTwP)				DTwP-HB- Hib1	DTwP-HB- Hib2	DTwP-HB- Hib3		DTwP กระตุ้น 1		DTwP กระตุ้น 2	Td และ ทุก 10 ปี
Hib ⁴ (Hib)											
โนล์โว ⁵ ชนิดกิน (OPV)				OPV1	OPV2+IPV	OPV3		OPV กระตุ้น 1		OPV กระตุ้น 2	
โรต้า ⁶ (Rota)				Rota1	Rota2	(Rota3)					
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ⁷ (MMR)							MMR1	MMR2			
ใช้สมองอักเสบเจือ ⁸ (Live JE)							JE1		JE2		
ไข้หวัดใหญ่ ⁹ (Influenza)							Influenza ให้ 2 เช็ม ห่างกัน 1 เดือน ในครั้งแรก				
เอดีพีวี ¹⁰ (HPV)											เด็กหญิง ประมาณ 5 2 เช็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

วัคซีนอื่นๆ ที่อาจให้เสริม หรือหดแทน

วัคซีน	อายุ	2 เดือน	4 เดือน	6 เดือน	12-15 เดือน	18 เดือน	2 ปี	4 ปี	6 ปี	9 ปี	11-12 ปี	15 ปี
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไดร์เซลล์ ³ (DTaP, Tdap หรือ TdaP) ตับอักเสบบี (HB) โนล์โว ⁵ ชนิดฉีด (IPV) Hib ⁴ (Hib)		DTaP-HB- IPV-Hib1	DTaP-(HB)- IPV-Hib2	DTaP-HB- IPV-Hib3		DTaP-IPV-(Hib4) กระตุ้น 1		DTaP-IPV หรือ Tdap-IPV กระตุ้น 2			Tdap หรือ TdaP ต่อไป Td หรือ Tdap ทุก 10 ปี	
นิวโน่คอคอลัสชนิดดอนจูเกต ¹¹ (PCV)		PCV1	PCV2	(PCV3)	PCV4							
ใช้สมองอักเสบเจือ ⁸ (Inactivated JE)					JE1, JE2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ และ JE3 อีก 1 ปี							
ตับอักเสบเอ ¹² (HAV)					HAV ชนิดเชื้อไม่มีชีวิต ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน ชนิดเชื้อมีชีวิต ฉีดครั้งเดียวเมื่ออายุ 18 เดือนขึ้นไป							
อีสุกอีส ¹³ (VZV) หรือวัคซีนรวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีส (MMRV)					VZV1 (หรือ MMRV1)	VZV2 (หรือ MMRV2)						
ไข้หวัดใหญ่ ⁹ (Influenza)					Influenza ให้ปีละครั้ง (ในเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปีให้ 2 เช็ม ห่างกัน 1 เดือน ในครั้งแรก)							
เอดีพีวี ¹⁰ (HPV)											HPV 2 เช็ม ห่างกัน 6-12 เดือน	
ใช้เลือดออก ¹⁴ (DEN)											DEN 3 เช็ม 0, 6 และ 12 เดือน	
พิษสุนัขบ้า ¹⁵ (Rabies) ก่อนการสัมผัสรอย					2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 7 วัน							

